Cobertura vacinal brasileira contra Poliomielite: cenário atual e repercussões

Brazilian vaccine coverage against Polyomyelitis: current scenario and repercussions

Danielle Lima Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Instituição: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Endereço: R. Aprígio Veloso, 882, Universitário, Campina Grande - PB,

CEP: 58428-830

E-mail: danielle.lima@estudante.ufcg.edu.br

Jank Landy Simôa Almeida

Enfermeiro, Professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Instituição: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Endereço: R. Aprígio Veloso, 882, Universitário, Campina Grande - PB,

CEP: 58428-830

E-mail: jankalmeida@gmail.com

RESUMO

Objetivo: Analisar os dados de cobertura vacinal brasileira do ano de 2016 a 2021 e prováveis cenários que justifiquem as informações obtidas. Metodologia: Revisão integrativa da literatura e análise de dados epidemiológicos através da plataforma TABNET, disponível no sistema DATASUS, do Ministério da Saúde. Resultados: Cobertura vacinal total entre as cinco regiões de 81,44%. A Região Centro-Oeste atingiu cobertura acima de 95% em 2016, sendo reduzida em 2017, demais regiões obtiveram aumento. Cobertura vacinal em 2018 ascende, exceto região Norte. No ano seguinte, a região Norte foi a única que obteve aumento. Em 2020 e 2021, as cinco regiões demonstraram queda nos índices de cobertura vacinal. Conclusão: Risco de reintrodução da poliomielite diante de baixas coberturas vacinais, as quais foram acentuadas pela pandemia de SARS-CoV-2, bem como demais fatores.

Palavras-chave: movimento contra vacinação, cobertura vacinal, imunização, Poliomielite.

ABSTRACT

Objective: To analyze Brazilian vaccination coverage data from 2016 to 2021 and likely scenarios that justify the information obtained. Methodology: Integrative literature review and analysis of epidemiological data through the TABNET platform, available in the DATASUS system, of the Ministry of Health. Results: Total vaccination coverage among the five regions of 81.44%. The Midwest Region reached coverage above 95% in 2016, being reduced in 2017, other regions increased. Vaccination coverage in 2018 increases, except for the North

region. In the following year, the North region was the only one with an increase. In 2020 and 2021, the five regions showed a drop in vaccination coverage rates. Conclusion: Risk of reintroduction of poliomyelitis in the face of low vaccine coverage, which was accentuated by the SARS-CoV-2 pandemic, as well as other factors.

Keywords: movement against vaccination, vaccination coverage, immunization, Polio.

1 INTRODUÇÃO

A partir do Plano Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, foi possível a redução do número de doenças através das campanhas vacinais, tais como varíola, sarampo, rubéola e poliomielite e, atualmente, destaca-se em nível mundial diante da erradicação e controle de doenças imunopreveníveis (BRASIL, 2022a). Conhecida pelo senso comum como paralisia infantil, a poliomielite consiste em uma doença infectocontagiosa de etiologia viral, podendo ou não apresentar sintomas. A paralisia, de fato, ocorre em apenas 1% dos indivíduos contaminados, contudo, seu início e evolução ocorrem rapidamente, acometendo principalmente os membros inferiores (SÃO PAULO, 2022a). A poliomielite foi erradicada do Brasil no ano de 1990 e, do continente Americano em 1991 (BRASIL, 2022b; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2017). Contudo, a enfermidade ainda permanece endêmica em alguns países, como Afeganistão e Paquistão (BRASIL, 2022b).

Na última década, o PNI identificou redução da cobertura vacinal contra a poliomielite, despertando preocupação nacional (ARROYO, et al., 2020). A meta de cobertura vacinal estabelecida para manutenção da erradicação da doença é de 95%, contudo, a partir do ano de 2016 esses índices apresentaram-se em queda (VERANI, 2020; ARROYO, et al., 2020). Destarte, caso a meta estipulada não seja alcançada, o Brasil possui alto risco de reintrodução da poliomielite, prejudicando o crescimento e desenvolvimento adequado infantil e possibilitando aumento da morbimortalidade nesse grupo (SÃO PAULO, 2022a; SÃO PAULO, 2022c).

A redução da cobertura vacinal brasileira contra poliomielite tem impacto significativo na epidemiologia e morbimortalidade infantil, haja vista que a continuação dos índices reduzidos favorece o ressurgimento da doença no país, antes erradicada através da imunização. Isto posto, surge o seguinte questionamento: qual o cenário nacional atual de cobertura vacinal contra poliomielite e possíveis repercussões deste? Objetiva-se, através da presente pesquisa, analisar os dados de cobertura vacinal brasileira do ano de 2016 a 2021 e prováveis cenários que justifiquem as informações obtidas.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, abarcando artigos científicos dos últimos cinco anos (2017 a 2022), a partir da pesquisa controlada, aos pares, e sistematizada com os descritores Movimento contra Vacinação; Cobertura Vacinal; Imunização; Poliomielite. Estes obtidos através da plataforma Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), além de informações fornecidas pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) por meios eletrônicos.

Para obtenção de dados secundários estatísticos e atuais, foi utilizada a plataforma TABNET, inserida no sistema DATASUS, disponibilizada pelo MS. Os fatos foram adquiridos através do tópico “Assistência à Saúde”, especificamente no grupo “Imunizações - desde 1994”. Foi selecionada a opção de “Cobertura”, gerando gráficos através dos seguintes filtros: “Região”, “Ano”, “Coberturas Vacinais”, nos anos de 2016 a 2021, exclusivamente para a Poliomielite em “Seleções Disponíveis”, no subgrupo “Imuno”. Para a disposição gráfica dos dados, foi selecionado o tipo “Colunas”. Após os gráficos serem gerados através do TABNET, os mesmos foram exportados para o *software* Excel para análise e registro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cobertura vacinal total das regiões nos anos de 2016 a 2021 foi de 81,44%. A região Norte obteve os menores índices de coberturas vacinais nesse

período, possuindo total de 71,74%, seguida da região Nordeste, com 79,02%. Em 2016, apenas a região Centro-Oeste atingiu cobertura vacinal acima de 95%, totalizando 96,15%. No ano de 2017, a região Centro-Oeste obteve redução de 11,71% na cobertura vacinal, quando comparada ao ano anterior, enquanto as demais regiões obtiveram aumento, principalmente a região Norte, com 3,39%.

A região Norte registrou queda de 1,39% no ano de 2018, enquanto as demais regiões obtiveram aumento, em relação ao ano de 2017, com destaque para a região Nordeste (8,12%). Já em 2019, comparado a 2018, a região Norte foi a única região que registrou aumento da cobertura vacinal (2,53%), foram registradas quedas da cobertura vacinal nas outras 4 regiões, sendo a região Sudeste a mais prejudicada, com redução de 8,12%, seguida da região Nordeste, com 7,31%.

Em 2020, ano em que a pandemia de SARS-CoV-2 foi decretada, as 5 (cinco) regiões registraram queda nas coberturas vacinais, destacando-se a região Norte e Nordeste, com redução de 14,55% e 10,87%, respectivamente. Em contrapartida, no ano seguinte, as regiões Sudeste e Sul registraram maiores reduções nas taxas de cobertura vacinal, com 7,44% e 7,42%, respectivamente. Houve redução média de 8,10% na cobertura vacinal entre 2019 e 2020, e de 6,87% entre 2020 e 2021.

Gráfico 1: Cobertura Vacinal contra Poliomielite no Brasil, por região geográfica, por ano (2016 a 2021).

Tabela 1: Cobertura Vacinal contra Poliomielite no Brasil, por região geográfica, por ano (2016 a 2021).

Região	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1 Região Norte	72,28	75,67	77,06	79,59	65,04	60,86	71,74
2 Região Nordeste	81,55	81,92	90,04	82,73	71,86	66,04	79,02
3 Região Sudeste	86,31	87,56	92,66	84,54	77,74	70,30	83,27
4 Região Sul	87,50	89,82	89,91	89,04	86,18	78,76	86,90
5 Região Centro-Oeste	96,15	84,44	88,59	85,40	79,95	72,96	84,59
Total	84,43	84,74	89,54	84,19	76,07	69,43	81,44

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS), 2022.

A cobertura vacinal preconizada pelo PNI para manutenção da erradicação contra a poliomielite é de $\geq 95\%$ (VERANI, 2020). Após análise dos resultados, é possível identificar que apenas em 2016 essa meta foi atingida, pela região Centro-Oeste, não sendo ascendida pela região nos anos seguintes, bem como por nenhuma outra região.

Conforme Arroyo et al. (2020), uma das justificativas para a involução das coberturas vacinais é a falsa percepção de que não há necessidade de vacinação, haja vista que a enfermidade já se encontra erradicada, bem como falta de informações e acompanhamento dos serviços de saúde. Fatores relacionados à queda nos índices esperados de cobertura vacinal também podem se dar por questões socioeconômicas, atingindo classes sociais menos favorecidas, dificuldade no acesso à vacinação nos serviços de saúde, logística distributiva dos imunobiológicos, bem como a disseminação de *fake news* acerca da imunização e a redução do compartilhamento de informações científicas, principalmente pelos veículos digitais, cujas informações falsas e sensacionalistas tendem a serem entregues mais rapidamente e em maior proporção (SÃO PAULO, 2022c).

Observa-se, ainda, maior declínio da cobertura vacinal nos anos de 2020 e 2021, os quais sofreram forte influência da pandemia de COVID-19, podendo ser justificado pelo período de quarentena e intensificação das campanhas vacinais contra o novo coronavírus, com o objetivo de conter a transmissão do

mesmo, diminuindo a atenção do público e das unidades de saúde para as demais vacinas disponíveis (SÃO PAULO, 2022c).

4 CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados, possibilitou-se a comprovação da redução das coberturas vacinais brasileiras, verificadas por região e ano. A pesquisa é de fundamental relevância para a saúde pública, visto que a erradicação de doenças é um marco histórico para o país e influencia diretamente na morbimortalidade da população e, diante da ameaça de ressurgimento da poliomielite, vê-se a necessidade de aprofundamento científico para aperfeiçoamento do entendimento da situação-problema, intensificação da imunização em todo o país através de campanhas vacinais, visto que há possibilidade de continuação do declínio em 2022 diante da pandemia de COVID-19, além da disseminação da importância da vacinação infantil contra a poliomielite e demais patologias.

REFERÊNCIAS

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Poliomielite**, 2017. Disponível em:

<<https://www.paho.org/pt/topicos/poliomielite#:~:text=A%20poliomielite%2C%20comumente%20chamada%20de,sintomas%20semelhantes%20aos%20da%20gripe>>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasília. **Programa Nacional de Imunizações - Vacinação**, 2022a. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/acao-informacao/acoes-e-programas/programa-nacional-de-imunizacoes-vacinacao>>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasília. **Poliomielite**, 2022b. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/poliomielite-1>>.

ARROYO, L. H. et al. Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. **Cad. Saúde Pública**, v. 36, n. 4, p. 2-4, 2020.

VERANI, J. F. S.; LAENDER, F. A erradicação da poliomielite em quatro tempos. **Cad. Saúde Pública**, v. 36, sup. 2, p. 2-6, 2020.

VERANI, J. F. S. Poliomielite no Brasil: do reconhecimento da doença ao fim da transmissão. **Cad. Saúde Pública**, v. 36, sup. 2, p. 1-3, 2020.

SÃO PAULO. Governo do Estado. Centro de Vigilância Epidemiológica. **Nota informativa conjunta no 01/2022 - ddtha/dvimuni/cve/ccd/ses-sp**. São Paulo, 2022a.

SÃO PAULO. Governo do Estado. Centro de Vigilância Epidemiológica. Divisão de doenças de transmissão hídrica e alimentar. **Documento técnico da vigilância epidemiológica das paralisias flácidas agudas/poliomielite**. São Paulo, 2022b.

SÃO PAULO. Governo do Estado. Boletim Epidemiológico Paulista. **Paradigmas da adesão vacinal nos 1000 dias de vida: análise e repercussões na saúde pública**. São Paulo, v. 19, n. 217, p. 34-36, 2022c.